

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



LORRAINE

Bulletin n° 20 du 21 septembre 1995

GRANDES CULTURES

Limaces

De nombreux colzas y sont encore sensibles. Maintenir la surveillance jusqu'au stade 3 - 4 feuilles.

Les dégâts observés sur colza ont de fortes chances de se reproduire sur céréales (orge et blé). La technique de lutte préconisée sur colza reste valable pour les céréales :

- Au minimum un traitement, soit en mélange avec la semence, soit très rapidement après le semis (avant la sortie des germes). Ce traitement sera suivi d'une surveillance régulière, renouvelé dès apparition des premières limaces sous les pièges.

- Il est également possible de surveiller votre parcelle avant le semis et de faire

un premier épandage de granulés 8 à 10 jours avant celui-ci, si vous détectez la présence des limaces sous les pièges.

Rappelons que les produits à base de métaldéhyde, moins chers et plus respectueux de l'environnement, provoquent la mort des limaces par déshydratation. Une très forte humidité peut permettre leur réhydratation et leur survie. Les autres spécialités (Mesurol, Skipper, Sloggy et Malice) tuent les limaces par empoisonnement et restent efficaces en cas de pluies. Ils sont malheureusement plus chers et moins respectueux vis-à-vis de la faune auxiliaire (carabes, vers de terre,...).



Limaces : Risque élevé pour les céréales.

Colza : Dégâts altises faibles.

Colza

Altises

De nombreux colzas ont dépassé le stade de sensibilité à cet insecte (2 feuilles vraies) dont le vol a débuté à la mi-septembre. Les dégâts observés restent

très faibles et les traitements généralement inutiles. Continuer à surveiller les colzas les plus tardifs.

Désherbage graminées

Les graminées (vulpin, repousses) vont concurrencer les colzas et servir de relais aux pucerons avant leur déplacement vers les jeunes orges ou blés.

Pour les détruire, vous pouvez utiliser un des anti-graminées ci-dessous, à partir du stade 2 - 3 feuilles de l'adventice et quel que soit le stade du colza.

Matières actives	Spécialités commerciales (firme)	Dose/ha Graminées annuelles	Dose/ha Graminées vivaces
alloxydime sodium	Fervin (Schéring)	1 kg + 3 l huile Schéring	1 - 1,25 kg + 3 l huile Schéring
cycloxydime	Stratos Ultra (BASF)	2 l	4 l
fluazifop-p-butyl	Fusilade X 2 + Agral (SOPRA)	0,75 l + 0,1 % Agral	1,5 l + 0,1 % Agral
haloxyfop-R	Eloge (Bayer)	0,5 l - s'utilise sans huile	1 l (vivaces et paturins). S'utilise sans huile
propaquizafop	Agil (La Quinolécine)	1,2 l	2 l
quizalofop-éthyl isomère D	Targa D + (Pépro)	0,5 l + 2 l huile Sifren	1,15 l + 2 l huile Sifren sur graminées vivaces au stade 15 - 20 cm et paturins de 3 feuilles maximum et ray-grass après tallage
sethoxydime	Fervinal (Schéring)	2 l + 3 l Schéring	3 l + 3 l huile Schéring



